



## Portrait de santé du Québec et de ses régions 2006

DEUXIÈME RAPPORT NATIONAL SUR L'ÉTAT DE SANTÉ DE LA POPULATION DU QUÉBEC

*En un coup d'œil*

Québec

Cette affiche présente une sélection d'indicateurs décrivant certains aspects des déterminants et de l'état de santé de la population du Québec, dans chacune des 18 régions sociosanitaires. Un symbole accompagne parfois les données régionales pour indiquer une situation plus favorable ou moins favorable que celle du Québec.

Ces indicateurs sont extraits du *Portrait de santé du Québec et de ses régions 2006 : les statistiques – Deuxième rapport national sur l'état de santé de la population du Québec*. Ils sont classés selon le modèle adopté dans ce dernier. Davantage d'informations relatives à ces indicateurs, telles que les définitions, les méthodes de calcul et les sources, sont présentées dans ce document. S'y retrouvent également de nombreux autres indicateurs répartis en 151 fiches descriptives, des éléments méthodologiques et de calcul ainsi qu'un survol, pour chaque région, des déterminants et de l'état de santé de la population.

### LÉGENDE

- Situation PLUS FAVORABLE que celle du Québec.
- Situation MOINS FAVORABLE que celle du Québec.
- (00) Numéro de la fiche descriptive correspondante dans l'ouvrage « Portrait de santé du Québec et de ses régions 2006 : les statistiques »
- ND Non disponible
- n.c. Non comparable
- s.o. Sans objet

### NOTES

- Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
- \*\*n.p. Coefficient de variation supérieur à 33,33 %. La valeur n'est pas présentée.
- 1. La différence avec le Québec a fait l'objet d'un test statistique : les régions sont comparées à leur complément (reste du Québec) au seuil de 0,01 sauf dans le cas de l'indicateur 66 (Vaccin contre la grippe) où elles sont comparées à l'ensemble du Québec au seuil de 0,05.
- 2. S'applique à la région de l'événement.

Cette affiche est basée sur les informations tirées de l'ouvrage suivant:  
Le portrait de santé du Québec et de ses régions 2006 : les statistiques – Deuxième rapport national sur l'état de santé de la population du Québec

POUR COMMANDE ET CONSULTATION

Sites web de l'Institut national de santé publique du Québec ([www.inspq.qc.ca](http://www.inspq.qc.ca)) et du ministère de la Santé et des Services sociaux ([www.msss.gouv.qc.ca](http://www.msss.gouv.qc.ca)).

© Gouvernement du Québec, 2006

# En un coup d'œil

## Déterminants

### CONDITIONS DÉMOGRAPHIQUES

- (1) Taux d'accroissement (2001 à 2006)  
 (2) Indice de vieillesse (2006)  
 (4) Indice synthétique de fécondité (1999-2003)

### CONDITIONS SOCIOCULTURELLES

- (6) Familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans (2001)  
 (8) Population vivant seule (2001)

### CONDITIONS SOCIOÉCONOMIQUES

- (12) Population de 25 ans et plus n'ayant pas un certificat d'études secondaires (2001)  
 (16) Taux de chômage (2005)  
 (17) Revenu personnel par habitant (2004)  
 (19) Prestataires de l'assistance-emploi (2005)

### ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

- (26) Non-fumeurs exposés à la fumée secondaire<sup>1</sup> (2003)  
 (32) Logements nécessitant des réparations majeures (2001)

### ENVIRONNEMENT SOCIAL (Adaptation sociale)

- (33) Taux de sortie sans diplôme du secondaire (2003-2004)  
 (36) Taux de grossesse à l'adolescence<sup>1</sup> (14-17 ans) (1999-2003)  
 (39) Taux de crimes contre la personne<sup>1a</sup> (2003)  
 (43) Population n'ayant pas un niveau élevé de soutien social<sup>1</sup> (2000-2001)

### HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENTS

- (46) Population de 18 ans et plus sédentaire durant les loisirs<sup>1</sup> (2003)  
 (49) Fumeurs chez les 12 ans et plus<sup>1</sup> (2003)  
 (51) Population présentant une consommation élevée d'alcool 12 fois ou plus au cours d'une année<sup>1</sup> (2003)

### SERVICES DE SANTÉ

#### SERVICES PRÉVENTIFS

- (61) Femmes de 18 à 69 ans ayant passé un test de PAP au cours d'une période de moins de trois ans<sup>1</sup> (2003)  
 (62) Femmes de 50 à 69 ans ayant passé une mammographie au cours d'une période de deux ans (2003-2004)  
 (66) Population de 50 ans et plus ayant reçu le vaccin contre la grippe<sup>1</sup> (2003-2004)

#### SERVICES DE PREMIÈRE LIGNE

- (72) Taux de participation en médecine et chirurgie (2003)  
 (78) Taux de participation au régime d'assurance médicaments pour les personnes de 65 ans et plus (2003)  
 (80) Population ayant déclaré des besoins non satisfaits en matière de soins de santé (2003)

#### SERVICES HOSPITALIERS

- (84) Séjours excessifs à l'urgence (48 heures)<sup>2</sup> (2<sup>e</sup> semestre 2004-2005)  
 (88) Taux de césarienne<sup>1a</sup> (2000-2004)  
 (92) Taux ajusté d'hospitalisations liées à des conditions propices aux soins ambulatoires<sup>1</sup> (2000-2004)  
 (93) Taux ajusté de mortalité évitable<sup>1</sup> (2000-2003)

## État de santé

### ÉTAT DE SANTÉ GLOBALE

- (95) Population ne se percevant pas en bonne santé<sup>1</sup> (2003)  
 (96) Espérance de vie à la naissance<sup>1</sup> (2000-2003)  
 (98) Espérance de vie ajustée en fonction de l'état de santé<sup>1</sup> (2003)  
 (100) Population ne se percevant pas en bonne santé bucco-dentaire<sup>1</sup> (2003)  
 (104) Population ayant des problèmes de santé fonctionnelle<sup>1</sup> (2003)

### ÉTAT DE SANTÉ PHYSIQUE

#### MALADIES CHRONIQUES

- (109) Population présentant un surplus de poids<sup>1</sup> (2003)  
 (112) Taux ajusté de prévalence du diabète<sup>1</sup> (2003-2004)  
 (113) Taux ajusté d'incidence du cancer<sup>1</sup> (1999-2002)  
 (114) Taux ajusté de mortalité par tumeurs malignes<sup>1</sup> (2000-2003)  
 (115) Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire<sup>1</sup> (2000-2003)  
 (116) Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire<sup>1</sup> (2000-2003)  
 (117) Taux ajusté de mortalité pour des conditions associées au tabagisme<sup>1</sup> (2000-2003)

#### SANTÉ DES NOUVEAU-NÉS

- (118) Naissances de faible poids<sup>1</sup> (moins de 2 500 g) (1999-2003)  
 (122) Taux d'hospitalisation au cours de la première année de vie<sup>1</sup> (2000-2004)  
 (124) Taux de mortalité infantile<sup>1</sup> (2000-2003)

#### TRAUMATISMES NON INTENTIONNELS

- (126) Proportion de victimes de blessures<sup>1</sup> (2003)  
 (129) Taux ajusté de mortalité par traumatismes non intentionnels<sup>1</sup> (2000-2003)  
 (130) Conducteurs décédés avec un taux d'alcoolémie supérieur à la limite<sup>1</sup> (1997-2003)

#### MALADIES INFECTIEUSES

- (131) Taux d'incidence de l'infection à *Chlamydia trachomatis* génitale<sup>1</sup> (2000-2004)  
 (131) Taux d'incidence de l'infection à *Streptococcus pneumoniae*<sup>1</sup> (2000-2004)  
 (131) Taux d'incidence de l'infection entéro-hémorragique à *Escherichia coli*<sup>1</sup> (2000-2004)  
 (132) Taux de grossesses ectopiques<sup>1</sup> (2000-2004)

#### ÉTAT DE SANTÉ PSYCHOSOCIALE OU MENTALE

- (145) Population ne se percevant pas en bonne santé mentale<sup>1</sup> (2003)  
 (148) Population ayant vécu un épisode dépressif majeur<sup>1</sup> (2000-2001)  
 (149) Taux ajusté de mortalité pour des conditions associées à l'alcool<sup>1</sup> (2000-2003)  
 (151) Taux ajusté de mortalité par suicide<sup>1</sup> (2000-2003)

	ENSEMBLE DU QUÉBEC		BAS-SAINT-LAURENT	SAGUENAY – LAC-SAINT-JEAN	CAPITALE-NATIONALE	MAURICIE ET CENTRE-DU-QUÉBEC	ESTRIE	MONTREAL	OUTAOUAIS	ARITIBI-TÉMISCAMINGUE	CÔTE-NORD	NORD-DU-QUÉBEC	GASPÉSIE – ÎLES-DE-LA-MADELEINE	CHAUDIÈRE-APPALACHES	LAVAL	LANAUDIÈRE	LAURENTIDES	MONTÉRÉGIE	NUNAVIK	TERRES-CRIES-DE-LA-BAIE-JAMES
(1) Taux d'accroissement (2001 à 2006)	2,7	%	-1,9	-3,4	2,6	0,3	3,9	2,2	6,7	-4,2	-5,1	-10,2	-4,1	1,0	5,2	5,7	8,3	3,9	6,2	8,4
(2) Indice de vieillesse (2006)	86,7	%	118,8	95,0	109,3	109,0	92,4	96,6	65,3	74,7	70,3	41,7	132,2	87,7	84,6	67,8	66,8	73,9	8,5	14,6
(4) Indice synthétique de fécondité (1999-2003)	1,48	enfants/femmes	1,46	1,48	1,29	1,49	1,57	1,42	1,50	1,63	1,58	1,76	1,35	1,58	1,49	1,54	1,67	1,55	3,41	2,80
(6) Familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans (2001)	22,7	%	17,9	18,2	22,3	22,7	22,0	28,3	24,8	20,4	24,8	17,7	22,0	16,9	20,0	19,8	21,2	21,2	36,4	23,7
(8) Population vivant seule (2001)	15,2	%	14,4	12,0	17,6	15,8	16,3	20,4	13,4	14,2	11,5	11,2	11,3	12,4	11,6	10,5	12,0	12,2	7,5	3,9
(12) Population de 25 ans et plus n'ayant pas un certificat d'études secondaires (2001)	31,3	%	38,1	32,1	25,3	35,9	34,3	28,0	31,2	42,2	40,4	38,0	48,9	36,1	27,8	34,3	31,5	30,3	55,0	56,1
(16) Taux de chômage (2005)	8,3	%	8,5	10,7	5,8	9,0	6,6	10,8	6,9	9,3	ND	ND	17,9	6,4	7,9	6,2	7,6	6,9	ND	ND
(17) Revenu personnel par habitant (2004)	28 595	\$ courants	24 118	25 421	29 777	25 104	26 483	30 014	28 346	24 414	28 276	ND	19 346	27 255	30 623	27 826	29 614	30 341	ND	ND
(19) Prestataires de l'assistance-emploi (2005)	8,1	%	8,4	8,5	6,4	9,9	8,1	11,6	7,5	9,0	9,6	3,5	12,1	4,7	4,7	6,4	5,8	5,8	10,0	5,7
(26) Non-fumeurs exposés à la fumée secondaire <sup>1</sup> (2003)	15,7	%	16,7	16,5	13,3	15,5	13,6	13,3	17,0	18,8	26,3	23,9	22,5	15,8	17,1	20,9	17,1	16,3	ND	*5,3
(32) Logements nécessitant des réparations majeures (2001)	7,8	%	9,5	7,3	6,5	7,4	7,5	8,5	8,1	10,3	12,0	11,3	14,2	7,4	5,9	6,9	7,5	7,1	23,1	25,6
(33) Taux de sortie sans diplôme du secondaire (2003-2004)	14,8	%	4,1	1,5	11,7	ND	16,1	16,0	19,4	9,2	24,6	ND	14,5	9,7	14,4	18,5	22,4	15,3	ND	ND
(36) Taux de grossesse à l'adolescence <sup>1</sup> (14-17 ans) (1999-2003)	18,2	p. 1 000	8,5	13,9	13,8	15,5	18,8	24,9	20,7	15,6	25,7	17,0	11,8	8,4	18,6	17,8	19,6	16,9	85,6	57,5
(39) Taux de crimes contre la personne <sup>1a</sup> (2003)	984	p. 100 000	823	769	740	774	754	1 429	1 221	1 126	1 179	ND	1 114	525	930	882	850	808	2 314	ND
(43) Population n'ayant pas un niveau élevé de soutien social <sup>1</sup> (2000-2001)	14,4	%	13,7	11,5	12,8	16,0	18,4	18,2	7,4	17,9	13,4	17,2	10,2	16,0	15,4	13,9	11,2	11,1	ND	ND
(46) Population de 18 ans et plus sédentaire durant les loisirs <sup>1</sup> (2003)	26,3	%	27,8	28,3	22,2	24,1	23,7	25,7	24,2	29,9	26,5	23,4	30,1	26,3	27,7	27,5	23,9	30,2	ND	n.c.
(49) Fumeurs chez les 12 ans et plus <sup>1</sup> (2003)	25,9	%	22,1	26,6	24,6	23,0	23,6	27,0	26,1	26,9	29,3	28,7	27,4	24,3	28,3	28,5	27,7	24,7	ND	45,7
(51) Population présentant une consommation élevée d'alcool 12 fois ou plus au cours d'une année <sup>1</sup> (2003)	16,7	%	12,7	20,8	19,5	14,7	19,7	16,6	14,3	17,7	23,5	23,3	16,2	18,2	11,5	17,1	15,6	16,4	ND	28,4
(61) Femmes de 18 à 69 ans ayant passé un test de PAP au cours d'une période de moins de trois ans <sup>1</sup> (2003)	71,2	%	64,5	63,4	69,2	66,7	69,6	69,8	81,4	72,0	70,2	81,7	76,9	68,9	76,8	73,6	78,2	71,5	ND	67,9
(62) Femmes de 50 à 69 ans ayant passé une mammographie au cours d'une période de deux ans (2003-2004)	63,4	%	68,8	68,9	70,1	62,4	72,1	57,8	55,2	68,3	70,4	74,0	57,1	71,3	58,2	55,7	62,6	66,1	74,6	47,8
(66) Population de 50 ans et plus ayant reçu le vaccin contre la grippe <sup>1</sup> (2003-2004)	43,2	%	45,2	49,1	49,1	42,7	40,2	44,2	48,2	ND	44,2	ND	48,2	35,6	43,3	41,1	37,9	40,5	ND	ND
(72) Taux de participation en médecine et chirurgie (2003)	80,8	%	80,2	81,9	83,7	79,8	80,6	81,4	74,8	75,5	75,4	70,0	73,6	81,8	82,8	80,9	81,2	81,5	33,9	37,5
(78) Taux de participation au régime d'assurance médicaments pour les personnes de 65 ans et plus (2003)	91,4	%	93,5	93,9	93,0	92,5	92,3	90,5	88,3	91,2	87,9	90,6	92,0	93,7	91,3	91,7	90,8	91,0	ND	ND
(80) Population ayant déclaré des besoins non satisfaits en matière de soins de santé (2003)	12,6	%	9,8	11,5	7,1	11,1	9,8	14,9	15,5	15,5	12,4	7,4	8,3	10,0	13,0	15,3	12,2	13,5	ND	13,8
(84) Séjours excessifs à l'urgence (48 heures) <sup>2</sup> (2 <sup>e</sup> semestre 2004-2005)	6,0	%	3,5	0,9	3,2	4,2	2,2	9,6	10,7	2,9	5,1	s.o.	0,9	0,5	1,7	8,2	3,6	8,1	s.o.	s.o.
(88) Taux de césarienne <sup>1a</sup> (2000-2004)	20,1	p. 100 accouchements	21,5	17,9	20,6	18,4	14,9	22,1	20,1	18,1	21,7	19,4	19,9	23,2	17,5	19,3	17,6	19,0	**n.p.	**n.p.
(92) Taux ajusté d'hospitalisations liées à des conditions propices aux soins ambulatoires <sup>1</sup> (2000-2004)	45,4	p. 10 000	49,3	66,9	32,6	48,4	46,8	35,6	44,7	78,3	81,0	87,4	92,3	39,4	36,9	54,6	55,7	45,9	262,1	127,9
(93) Taux ajusté de mortalité évitable <sup>1</sup> (2000-2003)	103	p. 100 000	86	105	94	106	90	111	116	111	97	*79	92	88	96	108	106	103	*203	*115
(95) Population ne se percevant pas en bonne santé <sup>1</sup> (2003)	10,7	%	11,3	11,4	7,6	11,3	9,8	12,1	11,4	14,3	12,6	8,7	14,7	10,6	8,2	11,2	9,6	10,2	ND	17,2
(96) Espérance de vie à la naissance <sup>1</sup> (2000-2003)	79,4	ans	79,9	78,4	79,9	78,9	79,7	79,7	78,4	77,7	78,3	78,1	79,1	80,0	80,5	78,5	78,6	79,5	63,3	77,4
(98) Espérance de vie ajustée en fonction de l'état de santé <sup>1</sup> (2003)	71,1	ans	71,6	69,9	72,7	70,9	71,4	70,6	69,5	68,7	70,9	ND	70,0	71,5	73,6	69,9	71,2	71,2	ND	64,6
(100) Population ne se percevant pas en bonne santé bucco-dentaire <sup>1</sup> (2003)	13,8	%	11,9	12,3	10,5	13,1	13,2	15,6	13,7	18,9	10,8	13,3	14,2	1						